

EPISODIO AFECTIVO.

- ① Ep. Depresivo Mayor → 5 o más síntomas durante 2 semanas
uno síntoma 1) E° ánimo depresivo
2) pérdida interés o placer.
- ② Ep. Maníaco → - 1 E° anormal y persistente % elevados
- 1 semana (+ - si requiere hospitalización)
- durante al menos 30 + síntomas
4 si solo irritables.
- ③ Ep. mixto → cumple criterios D.M. y maníaco
excepto +
todo el día y todo día x 1 semana } A.
- ④ Ep. hipomaníaco → dura 4 días. C. A
→ 3 o + síntomas } C. B
→ 4 irritables.

TROC. DEPRESIVOS.

- ⑤ Ep. D.M.
episodio único
leve
grave
moderado.
- presenciar un único Ep. D.M.
→ no se aplica más
presenciar tro. esquizoafectivo
superpuesto a: EZQ
tro. esquizofrenia
tro. alucini
tro. psicótico N/E.

TNO D.M.
RECIDIVANTE

→ 20 + E.D.M

2 meses seguidos

→ no se replica mejor

→ nunca ep. maníaco, mixto, hipomaniaco

TNO.
DISTÍNICO

→ trs. de presio crónica!
durante mejor del día
x al menos 2 años

→ mientras este deprimido
2 según síntomas

→ durante 2 años (1 año ^{nino/} ^{adulto})
x síntomas x 2 m. citos Ay B.

TNO.
DEPRESIVO
NO ESPECIFICADO

TNO. DISTÓRICO PRE DEPRESIVO
durante última semana fase eutímica
último 12 m.

TNO DEPRESIVO TIPO
2 sem. síntomas de presio
9 items T.D.M.

TNO DEPRESIVO BREVE RECIDIVANTE
Ep de presio dur 2 días a 2 sem.
1 vez al en 12 ms.

TNO. DEPRESIVO PSICOTICO EN EZQ.
si presenta fase residual EZQ.

EPISODIO DEP. MAYOR SUPERPUESTO
a: trs. delirante
✓ psicótico N/E
fase activa EZQ.

TNO. BIPOLAR

T.B.I
Ep. maníaco único

- presencia único ep. maníaco.
- Sin ep. D.M. anterior
- no se explica mejor x

T.B.I
Ep. + recidiva
hipomaníaco

- Actual + recidiva hipomaníaco
- 1 ep. maníaco o mixto

T.B.I
Ep. + recidiva
maníaco

- + recidiva maníaco
- 1 ep. D.M., maníaco o mixto

T.B.I
Ep. + recidiva
mixto

- + recidiva mixto
- presencia E.D.M. o maníaco.

T.B.I
Ep. + recidiva
depresivo

- + recidiva depresivo
- idem.

T.B.I
Ep. + recidiva
NO ESPECIFICADO

- cumple criteria Hipomaníaco, mixto, maníaco
- excepto d.m. p
- presen. maníaco o mixto

TNO BIPOLAR II

→ història o presència 1 o +
E.D.M.

→ presència 1 ep. hipomaniaco

→ 1/2 episodis maniacs

TNO. CICLOTÍMICO

→ al menys 2 añ número episodis
maniacs, dep. ~~de~~
no comple E.D.M.

→ 2 añ (1 añ ⁿⁱⁿ adult) NO diria presència símptomes

→ 2 añ 1/2 E.D.M., maniaco o mixt.

TNO. BIPOLAR NO ESPECIFICADO

→ altre ϕ mny repicla (4 añ)
símptomes maniaco i depresiu
no comple E.D.M.

→ ep. maniaco recidivents
1/2 símptoma depresiu.

OTROS TNOs. Eº ANIMO

DEBIDO A
ENF. MEDICA

→ predomine altre ϕ Eº animo
1) Δ -intens plaer total o ceri total act.
2) Eº animo elevat, xperiu o iniciat

→ alt. desitio a euf. mesura

DEBIDO A
INDUCCIO X
SUGT.

→ predomine altre ϕ Eº animo
1) Δ -intens plaer total o ceri total act.
2) Eº animo elevat, xperiu o iniciat

→ símptomes A aporcu mén xpte
abstinencia o intoleràcia.

FARMACOS.

Biofarmacéutica: fórmula de medicamento

Farmacocinética: lo q' organismo produce al fármaco

Farmacodinámica: lo q' sucede al organismo q' el fármaco.

ANTIPIQUÍOTICOS

CLOROPROPAZINA

HALOPERIDOL

CLOROPROPAZINA.

Inyectable 25 mg (Cl) / ml

Líquido oral 25 mg

Comprimidos 100 mg

Inyectable 25 mg

HALOPERIDOL

Inyectable 5 mg

Comprimidos 2 mg ; 5 mg.

TIPOS ANTIMAN

AMITRIPTILINA

FLUOXETINA.

AMITRIPTILINA

Comprimidos 25 mg

inicio 50 - 75 mg x día

HO 150 - 200 mg x día

FLUOXETINA.

inicio 10 mg / x día

a una semana Δ + 20 mg / día

HO 20 - 40 mg x día oral

Δ+ si no mejora en 60 días. al costo de usarlo 4 semanas.

TNO. BIPOLAR

CARBAMAZEPINA

CARBAMAZEPINA 200-600 inicio 200 mg / día oral
HO 400-600 mg / día

AC. VALPROICO 1000-2000

CARBONATO LITIO 300
600-1200

CARBONATO LITIO

inicio 300 mg / día oral

A+ de 5 a 7 días según concentración plasmática

HO 600-1200 x día oral
según concentración plasmática

ACIDO VALPROICO

inicio 500 mg / día oral
dosificación frecuente

HO 1000-2000 mg x día oral.

TNOS ANSIÓTICOS

BENZODIAZEPINA

2-10 mg x día oral

HO 10-20 mg x día

DIASEPAN



control rápido síntomas

2-10 no interviene
muscular

repetir 3-4 hrs.

TOC

ATAQUE PANICO

CLOMIPRAMINA

10 - 25 mg / día oral

HO 150 - 200 mg / día oral.

DEPENDENCIA
SUSTANCIA

CLORIDRATO DE TABONA.

NO superior 20 mg x día

HO si tiene 10 mg q' poca día
hasta 60 - 120 mg x día.

CLORIDRATO BUPRENORFINA.

2-8 mg sublingual

HO 4-32 sublingual.

A- 3 a 14 años a 8 mg.

BENZODIAZEPINA.
para q' utilize

HIPNOTICO

facilita sueño

Insomnio

MIORELAXANTE

relaja el músculo

Espasmo muscular

ANTI CONVULSIVO

contra convulsión

- intoxic. x drogas
- epilepsia

AMNESIA

distorsión memoria
corto plazo.

- antipsicof.
- sedante cingie menor

FARMACO NON - BENZODIAZEPINICO

ZOLPIDEN

ZOPICLONA



para
evitar
de pesadeira